

2015 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题

一、选择题:1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项符合

题目要求的, 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. 设 $\{x_k\}$ 是数列, 下列命题中不正确的是 ()

(A) 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = a$.

(B) 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = a$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$

(C) 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = a$

(D) 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k+1} = a$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 其二阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示, 则曲线

$y = f(x)$ 的拐点个数为 ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则

则

$\iint_D f(x, y) dx dy = ()$

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

(B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

(C) $2 \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x}}^x f(x, y) dy$

(D) $2 \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2x-x}} f(x, y) dy$

4. 下列级数中发散的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ (C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$, 若集合 $\Omega = (1, 2)$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解

的充分必要条件为 ()

(A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$ (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$ (C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$ (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中

$p = (e_1, e_2, e_3)$, 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 (x_1, x_2, x_3) 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 ()

(A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

7. 设 A, B 为任意两个随机事件, 则 ()

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$ (B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$

(C) $P(AB) \leq \frac{P(A)+P(B)}{2}$ (D) $P(AB) \geq \frac{P(A)+P(B)}{2}$

8. 设总体 $X \sim B(m, \theta)$, x_1, x_2, \dots, x_n 为来自该总体的简单随机样本, \bar{X} 为样本均值, 则

$E\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2\right] = ()$

(A) $(m-1)n\theta(1-\theta)$ (B) $m(n-1)\theta(1-\theta)$

(C) $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$ (D) $mn\theta(1-\theta)$

二、填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

9 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \quad .$

10 设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} xf(t)$, 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) =$

11 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} =$

12 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解, 且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3, 则 $y(x) =$

13 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 2, -2, 1, $B = A^2 - A + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则行列式 $|B| =$

14 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P(XY - Y < 0) =$

三、解答题: 15~23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + \alpha \ln(1+x) + bx \cdot \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a, b, k 的值。

16、(本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D x(x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$

17、(本题满分 10 分)

为了实现利润最大化, 厂商需要对某商品确定其定价模型, 设 Q 为该商品的需求量, p 为价格, MC 为边际成本, η 为需求弹性 ($\eta > 0$)

(i) 证明定价模型为 $p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$

(ii) 若该商品的成本函数为 $C(Q) = 1600 + Q^2$, 需求函数为 $Q = 40 - p$, 试由 (1) 中的

定价模型确定此商品的价格。

18、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零, 若对任意的 $x_0 \in I$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式。

19、(本题满分 10 分)

(i) 设函数 $u(x)$, $v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

(ii) 设函数 $u_1(x), u_2(x), K, u_*(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x)Ku_*(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式。

20 (本题满分 11 分)

(20) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $A^3 = 0$.

(i) 求 a 的值;

(ii) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 求 X .

21 (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$, 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$,

(i) 求 a, b 的值 (ii) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

22 (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数。

(1) 求 Y 的概率分布；

(2) 求 EY 。

23 (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数， X_1, X_2, \dots, X_R 为来自该总体的简单随机样本。

(1) 求 θ 的矩估计量；

(2) 求 θ 的最大似然估计量